

Fédération	PROTOCOLE	1/3
Dinan ;Dinard Saint-Malo	Cordarone intra veineux	<i>Date de création Septembre 2004 Indice de révision Septembre 2006</i>
	<u>Mots clés</u> : Cordarone	

1°) OBJECTIF(S) : Modalités pratiques d'utilisation de la cordarone IV.

2°) DOMAINE D'APPLICATION :

Fédération inter hospitalière de cardiologie
Réseau CardioRance

3°) LES PERSONNELS CONCERNÉS :

IDE

4°) LES DÉFINITIONS : : Anti arythmique de classe III selon la classification de Vaughan Williams.

5°) LES TEXTES DE RÉFÉRENCES :

Dictionnaire Vidal

6°) LES MODALITES PRATIQUES :

INDICATIONS :

- Troubles du rythme graves, notamment :
 - Troubles du rythme auriculaire avec rythme ventriculaire rapide.
 - Tachycardies du syndrome de Wolff Parkinson White.
 - Troubles du rythme ventriculaire documentés symptomatiques et invalidants.

CONTRE INDICATIONS :

- Absolues :
 - Bradycardie sinusale et bloc sino-auriculaire non appareillés.
 - Maladie du sinus non appareillée.
 - Troubles conductifs de haut degré non appareillés.
 - Collapsus cardiovasculaire, hypotension artérielle sévère.
 - Hypersensibilité connue à l'iode.

Fédération	PROTOCOLE	2/3
Dinan ;Dinard Saint-Malo	Cordarone intra veineux	<i>Date de création Septembre 2004 Indice de révision Septembre 2006</i>
	<u>Mots clés</u> : Cordarone	

- ❑ Relatives :
 - Anti arythmiques de la classe Ia, sotalol, médicaments non antiarythmiques donnant des torsades de pointes, laxatifs stimulants et diltiazem injectable.
 - Femme enceinte ou qui allaite.
 - Hyperthyroïdie.

EFFETS INDÉSIRABLES :

- ❑ Bouffées de chaleur, sueurs, nausées.
- ❑ Baisse tensionnelle, généralement modérée et transitoire.
- ❑ Bradycardie.
- ❑ Effet pro arythmique rare.
- ❑ élévation précoce et souvent modérée des transaminases

MODALITÉS D'ADMINISTRATION :

Ampoule 3 ml / 150 mg

A passer par voie intra veineuse, avec un pousse seringue électrique

- ❑ Nécessite la mise en place d'une voie centrale : Drum ou voie centrale classique (jugulaire ou sous clavière.)
- ❑ Bolus : 2 ampoules en 20 minutes
- ❑ Préparer 2 ampoules +14 cc d'eau pour préparation injectable =
 - total 20 cc = vitesse 60 cc/h
- ❑ Perfusion continue : 4 à 6 ampoules /12 h
 - 4 ampoules + 36 cc d'eppi = 48 cc = vitesse 4 cc / h
 - 6 ampoules + 30 cc d'eppi = 48 cc = vitesse 4 cc / h
- ❑ Faire un ECG lors du retour en rythme sinusal.

Fédération	PROTOCOLE	3/3
Dinan ;Dinard Saint-Malo	Cordarone intra veineux	<i>Date de création Septembre 2004 Indice de révision Septembre 2006</i>
	Mots clés : Cordarone	

Archivage

Papier : Dr Rialan
Informatique : Dr Rialan

	Rédacteur	<u>vérificateur</u>	Validation pour diffusion
<i>Nom et Fonction</i>	Dr Rialan IDE Guitton	Dr Bazin Dr Denolle Dr Rialan	Dr Bazin Dr Denolle Dr Rialan
<i>Date :</i>	27 / 09 / 2004		
<i>Visa</i>			

Ce document a été soumis au CLIN