Fédération	PROTOCOLE	1/3
<u>Dinan ;Dinard</u> <u>Saint-Malo</u>	Corvasal Intra veineux	<i>Date de création Septembre 2004 Indice de révision Septembre 2006</i>
	<u>Mots clés</u> : Corvasal	

1°) OBJECTIF(S) : Modalités d'utilisation du corvasal intra veineux.

2°) DOMAINE D'APPLICATION :
Fédération inter hospitalière de cardiologie
Réseau CardioRance

3°) LES PERSONNELS CONCERNES :
IDE

4°) LES DEFINITIONS : vasodilatateur / anti angineux

5°)LES TEXTES DE REFERENCES :
Dictionnaire Vidal

6°)LES MODALITES PRATIQUES :

INDICATIONS : angor instable.

CONTRE INDICATIONS : hypotension artérielle.

EFFETS INDÉSIRABLES :

- Céphalées.
- Hypotension artérielle.
- Troubles digestifs : vomissements, douleurs abdominales, diarrhées.
- Bouffées de chaleur.
- Eruption maculopapuleuse.

Fédération	PROTOCOLE	2/3
Dinan ;Dinard Saint-Malo	Corvasal Intra veineux	<i>Date de création Septembre 2004 Indice de révision Septembre 2006</i>
	<u>Mots clés</u> : Corvasal	

INCOMPATIBILITÉS : ne doit pas être administré dans la même ligne de tubulure de perfusion que l' enoximone (perfane), le furosémide ou le nitroprussiate de sodium.

MODALITES D'ADMINISTRATION :

Flacon 40 mg de lyophilisat

- ❑ Préparer la mise en solution du lyophilisat dans son flacon avec 5 ml de solvant puis compléter à 40 ml la seringue avec de l'eau pour préparation injectable.
- ❑ Injecter par voie intra veineuse avec un pousse seringue électrique.
- ❑ La solution ne doit pas être utilisée au-delà de 12 heures après sa préparation.
- ❑ Pendant la perfusion le corvasal ne nécessite pas de protection de la lumière.
- ❑ Débuter la perfusion à la dose de 1 mg/h (4 ml/h) et ajuster par paliers de 0,2mg/h (0,8 ml/h) toutes les 15 minutes, en fonction de la tension artérielle et des signes fonctionnels

Attention : pas de contre indication avec d'autres produits (en dehors des produits cités plus haut) mais toute injection ou perfusion sur la même voie veineuse à débit plus rapide entraîne un bolus risquant de provoquer une chute de la tension artérielle et de la fréquence cardiaque. Il est donc recommandé de mettre un connecteur de proximité tri lumière.

Fédération	PROTOCOLE	3/3
Dinan ;Dinard Saint-Malo	Corvasal Intra veineux	<i>Date de création Septembre 2004 Indice de révision Septembre 2006</i>
	Mots clés : Corvasal	

Archivage

Papier : Dr Rialan
Informatique : Dr Rialan

	Rédacteur	<u>vérificateur</u>	Validation pour diffusion
Nom et Fonction	Dr Rialan IDE Guitton	Dr Bazin Dr Denolle Dr Rialan	Dr Bazin Dr Denolle Dr Rialan
Date :	27 / 09 / 2004		
Visa			

Ce document a été soumis au CLIN