

<b>Fédération</b>	<b>PROTOCOLE</b>	<b>1/2</b>
<b>Dinan ;Dinard Saint-Malo</b>	<b>Hypnovel</b>	<i>Date de création Septembre 2004 Indice de révision Septembre 2006</i>
	<u>Mots clés</u> : Hypnovel	

**1°) OBJECTIF(S)** : Modalités pratique d'utilisation de l'hypnovel.

**2°) DOMAINE D'APPLICATION :**

Fédération inter hospitalière de cardiologie  
Réseau CardioRance

**3°) LES PERSONNELS CONCERNES** : IDE

**4°) LES DÉFINITIONS** : sédatif et hypno-inducteur, anxiolytique, myorelaxant, anticonvulsivant.

**5°) LES TEXTES DE RÉFÉRENCES :**

Dictionnaire Vidal

**6°) LES MODALITES PRATIQUES :**

INDICATIONS :

- ❑ Anesthésie générale
- ❑ Sédation sans anesthésie générale : examens complémentaires désagréables et douloureux : endoscopies, cathétérismes cardiaques, ponctions, biopsies.
- ❑ Anesthésies locorégionales et rachidiennes.
- ❑ Sédation prolongée en unité de soins intensifs chez les patients sous ventilation contrôlée.

CONTRE INDICATIONS :

- ❑ Absolues : myasthénie, ATCD d'intolérance et d'hypersensibilité aux benzodiazépines.
- ❑ Relatives : alcool.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

- ❑ Sédation vigile avant un examen douloureux
  - Voie IV dans les minutes précédant l'examen :
    - sujet jeune et en bon état général : 0,05mg/kg à 0,1 mg/kg.
    - sujet âgés ou débilisés : 0,025 à 0,05 mg/kg.
  - Voie IM 20 à 30 minutes avant l'acte médical :
    - sujets jeunes et en bon état général : 0,05 à 0,12 mg/kg.
    - sujet âgés ou débilisés : 0 ;025 à 0,07 mg/kg.

<b>Fédération</b>	<b>PROTOCOLE</b>	<b>2/2</b>
<b>Dinan ;Dinard Saint-Malo</b>	<b>Hypnovel</b>	<i>Date de création Septembre 2004 Indice de révision Septembre 2006</i>
	Mots clés : Hypnovel	

□ Aux soins intensifs, chez les patients sous ventilation contrôlée :

- Ampoule de 5 mg / 5 ml – pas de dilution nécessaire.
- Voie intraveineuse avec un pousse seringue électrique.
- Dose de charge : 0,03 à 0,3 mg / kg
- Dose d'entretien : 0,03 à 0,2 mg /kg / heure.

Posologie	1mg / h	2 mg / h	3 mg / h
Préparation seringue	2 amp (= 10 ml )	4 amp ( = 20 ml )	6 amp ( = 30 ml )
cc / h	1	2	3
Durée seringue	10 heures	10 heures	10 heures

**Archivage**

Papier : Dr Rialan  
Informatique : Dr Rialan

	<b>Rédacteur</b>	<b><u>vérificateur</u></b>	<b>Validation pour diffusion</b>
<b>Nom et Fonction</b>	Dr Rialan IDE Guitton	Dr Bazin Dr Denolle Dr Rialan	Dr Bazin Dr Denolle Dr Rialan
<b>Date :</b>	27 / 09 / 2004		
<b>Visa</b>			

Ce document a été soumis au CLIN