

Fédération	PROTOCOLE	1/2
Dinan ;Dinard Saint-Malo	Loxen intra veineux	<i>Date de création Septembre 2004 Indice de révision Septembre 2006</i>
	<u>Mots clés</u> : Loxen	

1°) OBJECTIF(S) : modalités pratiques d'utilisation du loxen intra-veineux.

2°) DOMAINE D'APPLICATION :

Fédération inter hospitalière de cardiologie
Réseau CardioRance

3°) LES PERSONNELS CONCERNES : IDE

4°) LES DEFINITIONS : inhibiteur calcique.

5°) LES TEXTES DE RÉFÉRENCES :

Dictionnaire Vidal

6°) LES MODALITES PRATIQUES

INDICATIONS : poussée hypertensive en milieu médical et en post opératoire.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

Ampoule de 10 mg / 10 ml.

Traitement d'attaque :

- IV directe : - soit 1 mg /min jusqu'à une dose cumulée de 10 mg.
-soit 2.5 mg sur 5 min à renouveler toutes les 10 min
jusqu'à une dose cumulée de 10 mg.
- IV lente : 8 à 15 mg / h sur 30 min. A passer avec un pousse seringue électrique.

8 mg / h / 30 min = 8 ml de loxen + 22 cc d'eppi = 30 cc ⇒ vitesse 60.

9 mg / h / 30 min = 9 ml de loxen + 21 cc d'eppi = 30 cc ⇒ vitesse 60

Traitement d'entretien :

par une perfusion continue (pousse seringue électrique) de 2 à 4 mg / h avec adaptation des doses par paliers de 0,5mg / h..

Préparer une seringue de 20 mg de loxen (2 ampoules) + 20 cc d'eppi. = 40 cc

Posologie	2	2.5	3	3.5	4
cc / h	4	5	6	7	8

Fédération	PROTOCOLE	2/2
Dinan ;Dinard Saint-Malo	Loxen intra veineux	<i>Date de création Septembre 2004 Indice de révision Septembre 2006</i>
	Mots clés : Loxen	

Le relais peut être également pris par le loxen 20 mg, à la dose de 60 mg / jour, en 3 prises quotidiennes, soit par le loxen LP 50 mg en 2 prises quotidiennes.

SURVEILLANCE : pouls, TA toutes les 5 minutes pendant le traitement d'attaque, puis toutes les 15 minutes pendant le traitement d'entretien.

EFFETS INDÉSIRABLES :

- Céphalées
- Flushs
- Tachycardie
- Polyurie transitoire
- Possibilité exceptionnelle d'hypotension orthostatique

INCOMPATIBILITÉS :

Précipitation avec les produits présentant en solution un pH > 6 : solution bicarbonatée, solution de ringer, diazépam, furosémide, thiopental.

Archivage

Papier : Dr Rialan
Informatique : Dr Rialan

	Rédacteur	<u>vérificateur</u>	Validation pour diffusion
Nom et Fonction	Dr Rialan IDEGuitton	Dr Bazin Dr Denolle Dr Rialan	Dr Bazin Dr Denolle Dr Rialan
Date :	27 / 09 / 2004		
Visa			

Ce document a été soumis au CLIN